

PICCHI Alberto, KUENZI Noémie, MOY Guénaël, MERONI Giulia, CURLETTO Giulia, BARTOLOMEI Javier  
Service de Psychiatrie Adulte, Hôpitaux Universitaires de Genève  
Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1226 Thônex, Suisse  
Contact: [Alberto.Picchi@hcuge.ch](mailto:Alberto.Picchi@hcuge.ch)

## INTRODUCTION

- La violence domestique (VD) représente un phénomène fréquent et néfaste parmi les adultes nécessitant des soins psychiatriques.<sup>1</sup>
- La VD se compose de deux entités distinctes: la violence entre partenaires intimes (VPI) et la violence familiale (VF).
- Dans la population citée, la prévalence et les caractéristiques de la VF sont nettement moins étudiées que celles de la VPI.<sup>2</sup>

## OBJECTIFS ET HYPOTHESES

- L'objectif de la présente étude est de déterminer la prévalence actuelle (< 12 mois) des deux formes de VD (VPI et VF) au sein d'une population consultant un centre ambulatoire de psychiatrie communautaire, ainsi que décrire le profil psychiatrique et socio-démographique des victimes.
- Hypothèse: la VF présente une prévalence comparable à celle de la VPI dans une population d'adultes consultant un centre ambulatoire de psychiatrie communautaire.

## METHODES

- Critères d'inclusion: Tout-e patient-e débutant un suivi ambulatoire intensif.
- Dépistage de la VD avec le *Hurt, Insult, Threaten, Scream Tool* (HITS) utilisée une fois pour détecter la VPI (P-HITS), une fois la VF (F-HITS).
- Recueil des données psychiatriques et socio-démographiques.
- Les éléments suivants ont été recherchés auprès des victimes de VD: 1) la présence d'un soutien juridique et 2) si la victime avait déjà parlé de la VD avec un-e soignant-e.

## CONCLUSIONS



- Les données confirment une haute prévalence de la VD récente (< 12 mois) dans une population d'adultes consultant un centre ambulatoire de psychiatrie communautaire.
- La VF et la VPI présentaient une prévalence comparable. Parmi les jeunes adultes (18-25 ans), néanmoins, la VF est plus fréquente, avec une prévalence de 27%.
- Implications pour la recherche: les effets sur la santé physique et mentale de la VF devraient être étudiés davantage. Des outils de détection spécifiques sont en outre manquants à ce jour.

## ARTICLES


<sup>1</sup>Oram S, Trevillion K, Feder G, Howard LM. Prevalence of experiences of domestic violence among psychiatric patients: systematic review. *Br J Psychiatry*. 2013 Feb;202:94-9. doi: 10.1192/bjp.bp.112.109934. PMID: 23377208.

<sup>2</sup>Trevillion K, Oram S, Feder G, Howard LM. Experiences of domestic violence and mental disorders: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2012;7(12):e51740. doi: 10.1371/journal.pone.0051740. Epub 2012 Dec 26. PMID: 23300562; PMCID: PMC3530507.


## RESULTATS (N=107)




**Prévalence de la VD (< 12 mois)**



**Prévalence et type de VD (< 12 mois) en fonction de l'âge des victimes**



**Aide juridique? VD déjà évoquée avec un médecin?**



**Lien avec l'agresseur en présence de VF**

