

L'image corporelle : médiatrice dans la relation entre les expériences psychotiques et les troubles des conduites alimentaires?

Lilia Houissa¹, Feten Fekih-Romdhane¹, Souheil Hallit^{2,3,4,5}, Majda Cheour¹, Alexandre Andrade Loch^{6,7}

1. Service de psychiatrie "E", Hôpital Razi, Manouba, Tunisie.
2. Faculté de Médecine et des Sciences Médicales, Université Saint-Esprit de Kaslik, Jounieh, Liban
3. Département de psychologie, Collège des sciences humaines et sociales, Université Effat, Jeddah, Arabie Saoudite
4. Université privée des sciences appliquées, Amman, Jordanie
5. Hôpital Psychiatrique de la Croix, Jal Eddib, Liban
6. Laboratoire de Neurosciences, Faculté de Médecine, Université de Sao Paulo, Sao Paulo, Brésil
7. Institut national des biomarqueurs en neuropsychiatrie, Conseil national pour le développement scientifique et technologique, Sao Paulo, Brésil

Introduction

La relation entre la psychose et les troubles de l'alimentation reste un domaine de recherche difficile auquel peu d'intérêt a été porté. En utilisant des données longitudinales, nous avons cherché à explorer l'hypothèse selon laquelle les voies menant des expériences psychotiques (EP) aux troubles des conduites alimentaires (TCA) et à l'indice de masse corporelle (IMC) sont médiées par des perturbations de l'image corporelle.

Matériel et méthode

Une étude longitudinale prospective a été réalisée sur une population cible de **510** lycéens âgés de 14 à 18 ans. Le recueil de données s'est étendu du mois d'Avril 2022 jusqu'en Avril 2023. La collecte s'est faite ainsi sur **trois temps**, séparés de 6 mois, chez la même population. En plus de données sociodémographiques, les élèves ont rempli trois auto-questionnaire : le **EAT-26**, le **CAPE-42** et le **MBSRQ-AS**.

EAT-26

- Évaluer les symptômes des TCA
- Outil de dépistage



CAPE-42

- 42 items
- Évaluation des symptômes positifs, négatifs et dépressifs, ainsi que le degré de détresse pour chaque item
- Seule la sous-échelle positive (20 items) a été utilisée.


MBSRQ-AS

- Évaluation de l'image du corps
- Cinq sous-échelles différentes :
 - Appearance Orientation
 - Appearance Evaluation
 - Overweight Preoccupation
 - Body Areas Satisfaction Scale
 - Self-Classified Weight

Résultats



La préoccupation par le surpoids en tant que médiateur entre les expériences psychotiques et les TCA



La satisfaction des parties du corps en tant que médiateur entre les expériences psychotiques et les TCA



- Pas de preuves d'une association prospective entre les EP et l'IMC.

Conclusions

Cette étude est la première à évaluer le rôle médiateur de l'image corporelle entre les EP et les TCA. Les résultats offrent de nouvelles voies prometteuses pour une intervention précoce visant à atténuer les effets des PE sur le DE chez les adolescents.

Références

1. Garner DM, Olmsted MP, Bohr Y, Garfinkel PE. The eating attitudes test: psychometric features and clinical correlates. *Psychol Med.* nov 1982;12(4):871-8.
2. Brown TA, Cash TF, Mikulka PJ. Attitudinal body-image assessment: factor analysis of the Body-Self Relations Questionnaire. *J Pers Assess.* 1990;55(1-2):135-44.
3. Konings M, Bak M, Hanssen M, van Os J, Krabbendam L. Validity and reliability of the CAPE: a self-report instrument for the measurement of psychotic experiences in the general population. *Acta Psychiatr Scand.* juill 2006;114(1):55-61.