

PARCOURS PEDOPSYCHIATRIQUES DES PATIENTS ACCUEILLIS DANS UN CENTRE D'INTERVENTION PRECOCE

NEMORIN Harmony, CHARRE Mylène, CHAUMETTE Boris et KREBS Marie-Odile
Pôle PEPIT, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences; France
harmo.nemorin@gmail.com

I.INTRODUCTION

Les centres d'interventions précoces prennent en charge des patients présentant des troubles psychiques émergents entre l'adolescence et le début de l'âge adulte. Ces âges correspondent à une période à **risque de rupture** dans le parcours de soins, qui est la **transition** de la **pédopsychiatrie** à la **psychiatrie adulte**.
Objectif principal de l'étude: analyser le parcours de soins pédopsychiatrique des patients adressés à un centre d'intervention précoce.
Objectifs secondaires: rechercher s'il existait des discontinuités de suivi et la place du centre d'intervention précoce dans la transition de la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte.

II.MATERIELS ET METHODES

Etude rétrospective observationnelle descriptive.

Les patients inclus étaient les nouveaux patients adressés au C'JAAD (Centre d'évaluation pour Jeunes Adultes et Adolescents) du GHU Paris sur l'année 2021.

Les données étaient recueillies dans les entretiens médicaux initiaux qui se faisaient de manière standardisée via une trame unique. Chaque patient a donné son accord à l'utilisation anonyme de leurs données médicales dans le cadre de la recherche.

III.RESULTATS

Recueil données	Rétrospectif Entretiens médicaux initiaux	Age moyen	19,74 +/- 3,31 ans	
Nombre patients inclus	194	Nombre mineurs	63	32,77 %
Année	2021	Nombre majeurs	131	67,52 %

Fonctionnement:	Parmi mineurs:
52 désinsertions scolaires-professionnelles	13 déscolarisés
127 insertions scolaires-professionnelles	44 scolarisés

Nombre total de patients mineurs	Nombre de suivis pédopsychiatriques en cours	Pourcentage des patients mineurs avec suivis en cours
63	41	66,12%

Moyens d'adressages	Nombre de patients	Pourcentage des patients
CPOA	31	15,97%
GHU	16	8,24%
Hospitalisations hors GHU	28	14,43%
CMP	1	0,51%
CMPP	1	0,51%
Psychiatres libéraux	21	10,82%
Pédopsychiatres libéraux	13	6,70%
Médecins généralistes	6	3,09%
Psychologues libéraux	9	4,63%
Ecoles/Universités	5	2,57%
Entourage	29	14,94%
Patient	14	7,21%

Tableau présentant les différents moyens d'adressages des patients au centre d'intervention précoce

Absence suivi pédopsychiatrique	88 patients	45,36 %
---------------------------------	-------------	---------


Tableau présentant le nombre de patients n'ayant pas bénéficié de suivi pédopsychiatrique

Nombre de patients symptomatiques avant 18 ans parmi les non suivis en pédopsychiatrie:	63	71,59 %
---	----	---------

ATCD Suivi psychologique	44	69,84%
ATCD Suivi orthophonique	15	23,80%
ATCD Suivi psychomotricien/ergothérapeute	1	1,58%

Tableau montrant le nombre de patients ayant des suivis paramédicaux parmi les non suivis en pédopsychiatrie


Motifs suivis pédopsychiatriques



- Troubles neurodéveloppementaux
- Spectre de la schizophrénie et autres troubles psychotiques
- Troubles dissociatifs
- Troubles bipolaires et apparentés
- Troubles dépressifs
- Troubles anxieux
- TOCs et apparentés
- Troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress
- TCA
- Troubles de l'alternance veille-sommeil
- Troubles disruptifs, du contrôle des impulsions et des conduites
- Troubles liés à une substance et troubles addictifs

Graphique présentant les symptômes présents avant 18 ans des patients suivis en pédopsychiatrie

Symptômes des patients présentant une rupture du suivi pédopsychiatrique



- Troubles du spectre de l'autisme
- Troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
- Troubles des apprentissages
- Symptômes psychotiques
- Dysphorie
- Trouble bipolaire
- Episode dépressif caractérisé
- Troubles anxieux
- Troubles obsessionnels-compulsifs
- Terreurs nocturnes
- Troubles du comportements hétéro-agressifs
- Conflits intrafamiliaux
- Non connus

Tableau présentant les symptômes des patients en rupture de suivi pédopsychiatrique

IV.CONCLUSION

Près de la moitié des patients référés à notre centre d'intervention précoce n'avaient pas de contact avec la pédopsychiatrie malgré le fait que 72% d'entre eux étaient symptomatiques. **21** patients qui étaient en rupture de soins pédopsychiatriques pendant près de 5 ans ont été **réintégrés** dans les soins.